

L'oral commencera avec une question de cours issue de la la liste des **questions de cours** associée à ce programme et sera évaluée sur 4 points. La réponse à cette question de cours doit être rapide et précise! (Pas plus de 20 minutes)

• **Cours** :

CHAPITRE IV COMPLÉMENTS SUR LES COURBES PLANES

I) Représentation des courbes planes usuelles

Les élèves doivent :

- différentier représentation cartésienne et représentation paramétrique d'une courbe plane
- identifier à partir d'une représentation cartésienne ou paramétrique les droites ou les cercles dans le plan

Révisions sur la géométrie plane de PTSI (exemple et exercice 1) avec **la fiche méthodologique bilan** où les élèves doivent :

- identifier les droites et les cercles du plan avec leurs éléments caractéristiques;
- savoir introduire et utiliser les outils calculatoires que sont le déterminant et le produit scalaire;
- pouvoir déterminer une projection orthogonale sur une droite et l'utiliser pour calculer la distance d'un point à une droite;
- savoir étudier la position relative d'une droite et d'un cercle;
- savoir étudier la position relative de deux cercles .
- savoir déterminer les tangentes à un point extérieur à un cercle donné.

II) Les coniques

II-1) Définition par foyer, directrice et excentricité et II-2) Equations réduites des coniques propres

Les élèves doivent pouvoir

- déterminer une équation cartésienne d'une conique donnée par un couple foyer/directrice et une excentricité en posant judicieusement un repère adapté au problème
- pouvoir obtenir une équation réduite de la conique à partir d'une équation cartésienne afin de pouvoir l'identifier (avec 3 cas selon la valeur de l'excentricité)

Pour le moment, on ne proposera aux étudiants que des coniques avec une équation cartésienne sans termes croisés

- faire une représentation de la conique en identifiant ses éléments caractéristiques sur une équation réduite
- Les éléments caractéristiques à savoir identifier à partir d'une équation réduite sont
- le centre pour une ellipse/hyperbole ou le sommet pour une parabole
 - les axes de symétries et, en particulier, l'axe focal (qui portent les foyers)
 - les demi-axes a et b permettant de positionner les sommets (les tangentes y sont perpendiculaires aux axes)
 - les asymptotes dans le cas d'une hyperbole

Les élèves n'ont pas à savoir retrouver les foyers, les directrices et l'excentricité à partir d'une équation.

- savoir préciser un paramétrage d'une conique et, réciproquement, savoir identifier une conique comme une courbe usuelle lorsqu'elle est donnée par un paramétrage classique

III) Tangente à une courbe plane, enveloppe d'une famille de droites

III-1) Tangente à une courbe donnée par une représentation paramétrique et III-2) Tangente à une courbe donnée par une équation cartésienne

Les élèves doivent :

- pouvoir déterminer la tangente à une courbe en un point de la courbe que celle-ci soit donnée en représentation paramétrique ou cartésienne
- connaître et calculer le vecteur gradient en un point d'une courbe donnée en représentation cartésienne et savoir que $\vec{grad}f$, s'il est non nul, est un vecteur normal pour la tangente à la courbe.
- connaître la notion de lignes de niveaux et la direction et l'orientation du champs de gradients associés

III-2) Enveloppe d'une famille de droites

Les élèves doivent :

- définir la notion d'enveloppe d'une famille de droites
- connaître la méthode pratique de détermination d'une enveloppe (raisonnement géométrique à refaire au cas par cas)

IV) Propriétés métriques d'une courbe plane

IV-1) Longueur d'une courbe plane et III-2) Repère de Frenet, courbure d'une courbe

Les élèves doivent :

- définir et calculer la longueur d'une courbe (en utilisant éventuellement la géométrie de la courbe pour réduire le domaine d'intégration)
- définir la notion d'abscisse curviligne et l'utiliser pour paramétrer la courbe par l'abscisse curviligne
- définir et calculer le repère de Frenet en un point régulier d'une courbe
- définir et calculer la courbure γ d'une courbe

soit par relèvement de \vec{T} : $\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'(t)}{s'(t)}$ si $\vec{T} = \cos \alpha(t) \vec{i} + \sin \alpha(t) \vec{j}$

soit à l'aide des formules de Frenet : $\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma \vec{N} \Leftrightarrow \frac{1}{s'(t)} \frac{d\vec{T}}{dt} = \gamma \vec{N}$

V) Développée d'une courbe régulière

Les élèves doivent :

- définir et déterminer le centre, le rayon et le cercle de courbure d'une courbe en un point birégulier
- définir et déterminer la développée d'une courbe régulière
 - soit en utilisant que c'est le lieu des centres de courbures
 - soit en utilisant que c'est l'enveloppe des normales de la courbe

On pourra consulter [l'étude de la cycloïde](#) et [l'étude de l'astroïde](#)

On pourra consulter [le TD n° 1](#), [le TD n° 2](#) du chapitre 4

Le Td n°3 sera finalisé lundi soir.

[CHAPITRE V](#) COMPLÉMENTS SUR LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Uniquement des exercices avec changement de variables pour résoudre une équation différentielle à coefficients non constants.

• **Exercices** :

- Tous les exemples et exercices du [chapitre V](#) auront été traités.
- Tous les exemples et exercices du [chapitre IV](#) auront été traités. L'exercice 7 est à préparer en DM.

FIN